

## KULLANMA TALİMATI

### VICKS VAPOSYRUP 200 mg/15 ml Ekspektoran Şurup Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** Her 15 ml şurup (1 ölçek), 200 mg guaifenesin içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sodyum benzoat, sodyum sitrat, şeker (sukroz), propilen glikol, gliserin, sorbitol E 420 çözeltisi (% 70'lik) ,etil alkol (%96'lık)mikrokristalin selüloz ve selüloz gum, sitrik asit, titanyum dioksit, mentol, doğal ve yapay portakal aroma F 9720, günbatımı sarısı S E110, kinolin sarısı S E104, saf su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında :**

1. **VICKS VAPOSYRUP nedir ve ne için kullanılır?**
2. **VICKS VAPOSYRUP kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **VICKS VAPOSYRUP nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **VICKS VAPOSYRUP'un saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. VICKS VAPOSYRUP nedir ve ne için kullanılır?**

VICKS VAPOSYRUP'un etkin maddesi guaifenesin, ekspektoranlar (balgam söktürücüler) olarak adlandırılan ilaç grubunda yer alır. Guaifenesin solunum yolundaki salgıların yapışkanlığını azaltarak balgamla atılmalarını kolaylaştırır.

Opak, oranj renkte, gözle görülebilen yabancı madde içermeyen, portakal ve mentol koku ve tatlı, yoğunca bir şuruptur. Burgulu kapaklı, cam şişelerde, 15 ml'lik ölçek ile birlikte takdim edilir.

VICKS VAPOSYRUP, balgamlı öksürüğe bağlı bronşiyal salgıların ve balgamın kıvamının yoğunluğunu azaltmaya yardımcı olmak için 12 yaş üzeri adolesanlar ve yetişkinlerde kullanılır.

Bu tıbbi ürün 12 yaş üzeri adolesan ve yetişkinlerde kullanılır.

#### **2. VICKS VAPOSYRUP'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler VICKS VAPOSYRUP'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.**

Eğer;

- VICKS VAPOSYRUP'un etkin maddesi guaifenesin ya da VICKS VAPOSYRUP'da bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiksensiz,
- Çocuğunuz 12 yaşın altındaysa,

- Şeker (sukroz) içerdiğinden, nadir kalıtsal fruktoz intolerans probleminiz (örneğin glukoz –galaktoz malabsorpsiyonu) varsa.

### **VICKS VAPOSYRUP’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.**

Eğer,

- Uzun süredir devam eden öksürüğünüz (örneğin; sigara içme, amfizem, astım) varsa veya öksürük büyük miktarda salgılanma ile birlikte oluyorsa,
- Böbreklerinize ve/veya karaciğerinize ilgili ciddi problemlerinizi varsa,
- İlacın kullanılmasına karşın, 7 gün içinde öksürük kesilmezse,
- Tekrarlama eğilimli baş ağrısı, döküntü, ateş eşlik ederse,
- Şeker (sukroz) içerdiğinden, şeker hastalığınız (diabetes mellitus) varsa.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse doktorunuza danışınız.

### **VICKS VAPOSYRUP’un yiyecek ve içecek ile kullanılması**

VICKS VAPOSYRUP yiyeceklerle birlikte ya da yalnız alınabilir. İlacı aç karnına kullanmayınız.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuz ilacı kullanabileceğinizi söylemediği sürece VICKS VAPOSYRUP’u almayınız. Hamilelik sırasında VICKS VAPOSYRUP’u kullanmanın risklerini ve yararlarını doktorunuzla görüşmelisiniz.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Emzirme dönemindeyseniz, doktorunuz ilacı kullanabileceğinizi söylemediği sürece VICKS VAPOSYRUP’u almayınız. Emzirme sırasında VICKS VAPOSYRUP’u kullanmanın risklerini ve yararlarını doktorunuzla görüşmelisiniz.

### **Araç ve makine kullanımı**

Bu tıbbi ürünün araç ve makine kullanımı üzerine etkisi yoktur.

### **VICKS VAPOSYRUP’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Bu tıbbi ürün sodyum benzoat ve sodyum sitrat içerir. Özellikle sodyum diyetinde olanların bu konuda dikkatli olmaları önerilir.

İçeriğinde bulunan sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Her dozda 7,65 g şeker (sukroz) içerir. Bu durum, diabetes mellitus hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu tıbbi üründe hacmin yaklaşık % 13'u kadar; örneğin her ölçekte (15 ml) 1.5 g'a kadar etanol (alkol) içerir; bu miktar her ölçekte 38 ml biraya ya da 15 ml şaraba eşdeğerdir. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

Günbatımı sarısı S (E110) isimli boyar maddeyi içerir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

VICKS VAPOSYRUP'un diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Öksürük baskılayıcı ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır.

24 saatlik idrar toplanarak, 5-hidroksiindolasetikasit (5-HIAA) ve vanililmandelik asidin (VMA) idrarda tespit edilmesine yönelik yapılan testlerde renk etkileşimi oluşabilir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. VICKS VAPOSYRUP Nasıl Kullanılır ?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

VICKS VAPOSYRUP,

- Yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda, 4 saatte bir 15 ml (1 ölçek),

Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

VICKS VAPOSYRUP, ilaçla verilen ölçek yardımıyla, oral yoldan, tok karnına alınabilir.

Günlük toplam miktar 6 dozu aşmamalıdır. Hekim tavsiyesi olmadan 7 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

VICKS VAPOSYRUP, 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

Yetişkinler için verilen doz uygulanır.

#### **Özel kullanım durumları:**

##### **Böbrek yetmezliği**

Yetişkinler için verilen doz uygulanır. Şiddetli böbrek yetmezliği olanlar dikkatli kullanılmalıdır.

##### **Karaciğer yetmezliği**

Yetişkinler için verilen doz uygulanır. Şiddetli karaciğer yetmezliği olanlar dikkatli kullanılmalıdır.

*Eğer VICKS VAPOSYRUP'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla VICKS VAPOSYRUP kullandıysanız:**

Çok yüksek dozlarda alındığında, mide-barsak sisteminde rahatsızlık, bulantı ve uyuşukluk görülür.

*VICKS VAPOSYRUP'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**VICKS VAPOSYRUP'u kullanmayı unutursanız**

Kaçırdığınız dozu hatırladığınızda alınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**VICKS VAPOSYRUP ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

VICKS VAPOSYRUP'u belirlenen tedavi süresinden daha kısa kullandığınızda, zararlı etki görülmesi beklenmez. Ancak bu durumda hastalık belirtilerinin, VICKS VAPOSYRUP tedavisine başlamadan önceki düzeyden daha az şiddette olsa da tekrar ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.

**4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, VICKS VAPOSYRUP'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın:	10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın:	10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan:	100 hastanın 1'inden az, fakat 1000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.
Seyrek:	1000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.
Çok seyrek:	10.000 hastanın 1'inden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen:	Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, VICKS VAPOSYRUP'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Ürtiker (kurdeşen) ve kaşıntı, deri döküntüleri,
- Yüz, dil, boğazda şişme
- Nefes darlığı, hırıltılı soluma
- Kan basıncında (tansiyonda) aşırı düşme, baş dönmesi, denge kaybı.

Bunların hepsi çok ciddi bir yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VICKS VAPOSYRUP'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Baş dönmesi,
- Uykusuzluk,
- Baş ağrısı,

- Bulantı,
- Kusma,
- Karın ağrısı,
- İshal.

Bunlar VICKS VAPOSYRUP'un hafif, sıklığı bilinmeyen yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. VICKS VAPOSYRUP'un Saklanması**

*VICKS VAPOSYRUP'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

#### **Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.**

*Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra VICKS VAPOSYRUP'u kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VICKS VAPOSYRUP'u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

***Ruhsat sahibi:*** Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.Ş.

Nidakule Ataşehir Kuzey Sit. C kapısı Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 3E 34746  
Ataşehir/İstanbul

***Üretim yeri:*** Sanofi İlaç San.ve Tic.A.Ş.

39780 Büyükkarıştıran Lüleburgaz/Kırklareli

*Bu kullanma talimatı 21.05.2017 tarihinde onaylanmıştır.*