


Bu bülten Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır.

SAĞLIK KURULUŞLARINDA KAPI TRİYAJI

COVID-19 Vaka Algoritmasına uygun şekilde (**önlük, tıbbi maske, yüz koruyucu ya da gözlük**) giyimli bir sağlık personeli tarafından triyaj yapılır.**Ateşiniz ya da ateş öykünüz var mı?** Evet Hayır**Öksürüğünüz var mı?** Evet Hayır**Nefes almakta güçlük ya da solunum sıkıntınız var mı?** Evet HayırYukarıdaki sorulardan herhangi birisine verilen yanıt **EVET** ise **HASTAYA MASKE TAKILIR** ve **COVID-19** için ayrılmış alana yönlendirilir.Yukarıdaki soruların tümüne verilen yanıt **HAYIR** ise hastaya aşağıdaki sorular sorulur.**Son 14 gün içerisinde yurt dışında bulundunuz mu?** Evet Hayır**Son 14 gün içerisinde ev halkından birisi yurt dışından geldi mi?** Evet Hayır**Son 14 gün içerisinde yakınlarınızdan herhangi birisi solunum yolu hastalığı nedeni ile hastaneye yattı mı?** Evet Hayır**Son 14 gün içerisinde yakınlarınızdan COVID-19 hastalığı tanısı olan birisi oldu mu?** Evet HayırHerhangi birisine **EVET** cevabı verilir ise **COVID-19** riski olduğu için **HASTAYA MASKE TAKILIR** ve **COVID-19** için ayrılmış alana yönlendirilir.<https://covid19.saglik.gov.tr/>

COVID-19 ŞÜPHESİ TAŞIYAN HASTALARDA TEST İÇİN ÖNCELİKLENDİRMELER

SEMPTOMLAR: ATEŞ , ÖKSÜRÜK , NEFES DARLIĞI

1

Hastaneye yatan tüm hastalarda ideal tedavi seçeneklerini sunmak, sağlık hizmetlerine bağlı enfeksiyon riskini azaltmak ve sağlık sisteminin bütünlüğünü korumak.

- Hastaneye yatırılan hastalar,
- Semptomları olan sağlık çalışanları.

2

Semptomları olup, enfeksiyona bağlı en yüksek komplikasyon riskine sahip kişilerin hızlı tespit edilmesini ve bu kişilere uygun şekilde triyaj yapılmasını sağlamak.

- Uzun süreli bakım gerektiren hastalar,
- 65 yaş ve üstü hastalar,
- Altta yatan kronik hastalığı olan hastalar,
- İlk müdahale ekibi çalışanları.

3

Hastane vakalarının hızla arttığı bölgelerde, hastalığın topluluğa yayılımını azaltmak ve zaruri çalışanların sağlığını koruma için kaynakların yeterli geldiği ölçüde bireylere test yapmak.

- Belirtileri olan kritik altyapı çalışanları,
- Yukarıdaki kriterlerden hiçbirine uymayan semptomlu bireyler
- Sağlık tesisi çalışanları ve ilk müdahale ekipleri,
- COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısının yüksek olduğu bölgelerde, hafif semptomları olan bireyler.

ÖNCELİĞİ OLMAYANLAR

- Herhangi bir belirtisi olmayan bireyler.

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/priority-testing-patients.pdf>

Solunum Yolu Örneklerinin Alınması

Alt solunum yolu:

Sputum (eğer alınacaksa): Hastanın ağız çalkalandıktan sonra derin öksürük ile gelen örnekler direkt olarak steril kaba* konur.Alt solunum yollarından **trakeal aspirat** ya da **bronkoskopik örnekler** tercih edilmelidir. (Bronkoalveolar lavaj, trakeal aspirat: 2-3 mL'lik örnek için steril kap* kullanılır.)Alt solunum yollarından örnek alınmadığı durumlarda ya da alt solunum yolu semptomları olmayanlarda, **nazofarengeal yıkama örneği** ya da **nazofarengeal ve orofarengeal sürüntü** birlikte gönderilmelidir.

Üst solunum yolu:

Nazofarengeal sürüntü/orofarengeal sürüntü: Gövdesi plastik, sentetik fiberden oluşan sürüntü çubukları kullanılmalıdır. Sürüntü çubukları, 2-3 ml viral taşıma medyumunu içeren steril tüplere konur.**Nazofarengeal sürüntü:** Sürüntü çubuğu, palatal düzleme paralel olacak şekilde burun deliğine yerleştirilir. Çubuğun, burun deliği-kulak mesafesi kadar ilerlemesi gerekir. Sürüntü çubuğu, salgıların emilebilmesi için burada birkaç saniye bekletildikten sonra, çevirilerek çıkarılır.

İkinci numunenin alınması

Olası vaka tanımına uyan,

Enfeksiyon bulguları ağırlaşarak devam eden kişilerden; alınan ilk numunenin üst solunum yolu numunesi olması,

Test sonucunun negatif olması

COVID-19 enfeksiyonu şüphesini dışlamaz!

Örneklerin saklanması:

- Örnekler, alındıktan sonra 72 saate kadar, 2-8 °C'de muhafaza edilmeli ve ivedilikle laboratuvara ulaştırılmalıdır.
- Alınan tüm numunelerin potansiyel olarak enfeksiyöz olduğu düşünülmesi,
- Alınan alma işlemleri damlacık / aerosolizasyona neden olan işlem olarak kabul edilmeli,
- Numune alan kişiler,
- Tek kullanımlık önlük, N95/FFP2 ya da N99/FFP3 maske, gözlük ya da yüz koruyucu, eldiven kullanılmalıdır.
- Eldiven öncesi ve sonrası el hijyeni sağlanmalıdır.

*Steril, vida kapaklı ve sızdırmaz kaplar

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html>

SAĞLIK BAKANLIĞI PROTOKOLLERİNE UYGUN HALE GETİREREK HAZIRLANMIŞTIR.

COVID-19 olası vaka tanımına uyan hastalarda;

Solunum yolu numuneleri SARS-CoV-2 açısından Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı ve belirlenen illerle derinlemesine laboratuvarları değerlendirilmektedir.



Tanı laboratuvarları listesi:

<https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yetkilendirilmis-tani-laboratuvarlari-listesi>

Duyuru

Ülkemiz sağlık tesislerinde görev yapan tüm hekimlerin, COVID-19 tedavisi gören hasta hasta ilaç istemlerini ve ayaktan hasta reçetelerini e- Nabız REÇETEM (recetem.ilaç.ibm.gov.tr) sistemi üzerinden giriş yapmaları gerekmektedir.

Sistem kullanımı hakkında bilgi <http://recetem.titck.gov.tr/> bağlantı adresinde yer almakta olup ayrıca sistemle ilgili soru ve sorunlar için TİTCK İletişim Merkezi (444 46 80) hizmet vermektedir.

“Bütün kahramanlar pelerin giymez.”

Varşova, Polonya



#EVDEKAL

İletişim ve geri bildirimleriniz için: eip.bulten@eczacibas.com.tr